

Methodist Health System

Recolección de muestra de materia fecal

- No debe tomar medicamentos anti-diarréicos, antiácidos o a base de bario o bismuto ni laxantes aceitosos, antes de la recolección de la muestra de materia fecal.
- Recolecte la muestra en un recipiente seco de plástico y de boca ancha o en una bolsa plástica grande, colocada sobre la abertura del asiento del inodoro. **NO USE LA MATERIA FECAL SI SE HA CAÍDO EN EL INODORO O SE HA MEZCLADO (CONTAMINADO) CON LA ORINA.**
- Tome una porción de la materia fecal y transfírela al recipiente correspondiente. Puede llenar varios frascos con la misma muestra de materia fecal.
- Los frascos de las marcas Parapak® Enteric Plus y Total Fix® son kits especiales que se usan para conservar y transportar muestras de materia fecal. **El líquido que se encuentra en el kit es tóxico, por lo que es de suma importancia manipular los recipientes con cuidado. No beba la solución y mantenga el kit fuera del alcance de los niños. El frasco tiene una línea que indica hasta dónde se debe llenar. Añada suficiente materia fecal hasta que llegue a la línea, pero no debe pasarse. Vuelva a colocar la tapa y ajuste fuertemente; luego, agítelo enérgicamente para que se mezcle el líquido con la materia fecal.**
- Colóquese las etiquetas a todos los recipientes de materia fecal con su nombre, fecha de nacimiento, fecha y hora de recolección de la materia fecal. Coloque los recipientes en una bolsa Ziploc.
- Los frascos de las marcas Parapak® (frasco verde) y Total Fix® (frasco negro) deben mantenerse a temperatura ambiente. Refrigere los demás recipientes. Consérvelos en bolsas refrigerantes durante la entrega. Las muestras se deben entregar en un período de 24 horas.
- Esta hoja sirve solo para proporcionar las instrucciones de recolección. El médico debe dar la orden escrita y firmada, que incluya el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el diagnóstico o los síntomas y los análisis solicitados.

Si tiene preguntas acerca de algún análisis, llame al médico que lo ordenó o al Centro de Patología al (402)354-4541 o (888) 432- 8980.

Análisis comunes de heces

- Cultivo de heces (incluye patógenos intestinales, Salmonella, Shigella, Campylobacter y toxina Shiga [**el frasco de tapa verde**])
- Panel de patógenos gastrointestinal en heces (PCR) [**el frasco de tapa verde**]
- C. Diff (toxina de Clostridium Difficile con reflejo en PCR) [**recipiente estéril**]
- Examen O & P (Giardia Ag & Cryptosporidium Ag) [**el frasco de tapa negra**]
- Sangre oculta (RBC) [**recipiente estéril**]
- Detección de ARN de Norovirus (Virus Norwalk) [**recipiente estéril**]
- Lactoferrina fecal (WBC Fecal) [**recipiente estéril**]
- Antígeno de Helicobacter pylori [**recipiente estéril**]

Revisado en 9/2017 y actualizado en 02/2021. Nebraska Methodist Health System. Todos los derechos reservados.

Todo el contenido del presente documento es para fines educativos, informativos y de guía únicamente, y no tiene el propósito de reemplazar la recomendación, el diagnóstico o el tratamiento médico profesional individualizado. Nada de lo que se incluye aquí debe establecer o ser utilizado para establecer la definición legal de "estándar de cuidado". Este contenido debe utilizarse como guía y, dado que puede no aplicarse universalmente a todos los pacientes en todas las situaciones, los profesionales de la salud deben utilizar este contenido con un juicio independiente y evaluando caso por caso.